

Synnytyssalin tarkistuslista: informoi tarvittaessa obstetriikko ja anestesialääkäri

Listassa mukana selitteet, laita esille paikkaan josta se helposti katsottavissa. Toinen lyhyt lista käyttöön

1. Terve: kyllä / ei: merkittävä perussairaus

- vaikuttaako vitaali elintoimintoihin: hengitys, verenkierto, tajunta, verenvuoto
- esim. synnynnäinen sydänvika, vaikea keuhkotauti, vuotohäiriö, aineenvaihduntasairaus, kasvoanomalia, CP, kehitysvamma, nivelreuma, lihassairaus, neurologinen sairaus tms.

2. Tämänhetkinen lääkitys: ei / kyllä: mikä

3. Normaali painoinen tai vain lievästi lihava = ok

- jos **BMI > 40 > 50 ilmoita synnytyslääkärille**
- jos **BMI > 60 ilmoita anestesialääkärille**
- jos sairaalloisen lihava (= ongelmia): esim. paino > 140 kg, **yhteys anestesialääkäriin** (hengittämis/happeutumisongelma, ei tippateitä, ei kaulaa / ei leukaa, suu aukeaa huonosti, ilmatieongelma? teknisesti haastava puudutettava, vaatii aikaa, joten soita anestesialääkärille: epiduraali heti paikalleen kun synnytys käynnistynyt, **varmista ensin synnytyslääkäriltä**: synnytys käynnissä, ei estettä analgesialle)

4. Ilmatie: normaali: kyllä / ei: ilmoita anestesialääkärille

- **katso että suu aukeaa ja niska taipuu, jos ongelmia, kysy anestesialääkäriltä**
- suun tulee aueta niin, että kolme (3) sormea poikittain mahtuu suuhun, leuan alle jää 3 sormenleveyttä, ja niska taipuu taakse
- elleivät kaikki kriteerit täyty tai jos et osaa arvioida, soita anestesialääkärille

5. Allergiat, anafylaksia : ei / kyllä, jos anesteeteille, ilmoita anestesialääkärille

6. Raskaushäiriöt: ei / kyllä

- vaikea toksemia , vuoto- ja hyytymishäiriö
- **Tromb-taso < 100**: ei / kyllä: ilmoita synnytyslääkärille, tarvittaessa anestesialääkärille

7. Hb neuvolassa, tai nyt otettu

- veriryhmä, vasta-aineet neg/ **pos**: verivaraus
- Hb < 100: kysy verivaruksen tarpeellisuudesta synnytyslääkäriltä, informoi tarvittaessa anestesialääkärinä

8. Potilas vuotaa: ei / kyllä

- kyllä > 1 litra: ilmoita synnytyslääkärille
- kyllä > 2 litraa: ilmoita synnytyslääkärille, laita nesteitä tippumaan, mieti verituotteiden tarvetta, ilmoita tarvittaessa anestesialääkärille
- kyllä > 3 litraa: ilmoita anestesialääkärille

9. Toimiva tippatie

- mitä nesteitä mennyt/menossa (oksisosiini? kyllä / ei)
- ei / ei tarvetta / ei saatu: ilmoita tarvittaessa anestesialääkärille

10. Syöminen ja juominen

- syönyt alle 6, tai juonut alle 3 tuntia sitten: aspiraatoriski jos yleisanestesian tarve